



INSTITUTO SALVADOREÑO
DEL SEGURO SOCIAL

CIRCULAR	
AMPLIACIÓN DE USO DE GABAPENTINA 300 MG CÁPSULA	
Para:	Directores de Centros de Atención, Coordinadores de Comités Locales de Farmacoterapia, Jefes de Servicio, Jefes de Departamento, Jefes de Farmacia, Médicos Prescriptores.
De:	Sección Regulación de Medicamentos, Departamento de Regulación.
Asunto:	Ampliación de uso de Gabapentina 300mg para médicos Especialistas.
Fecha:	19 de abril de 2021.

Con el objetivo de brindar una atención de calidad a los derechohabientes promoviendo el uso racional de medicamentos, se hace de conocimiento a los centros de atención la siguiente información en relación a la ampliación de las regulaciones y criterios de uso del código 8080308 Gabapentina 300mg cápsula:

1. Criterio de uso:

- Tratamiento Adjunto en Epilepsia de difícil Control.
- Tratamiento de segunda línea en dolor neuropático periférico en adultos, cuando hay falta de respuesta o intolerancia a la terapia con Antidepresivos Tricíclicos (ATC), o existe una contraindicación a estos.

NOTA: La eficacia y seguridad de Gabapentina por más de 5 meses de tratamiento no ha sido evaluada en ensayos clínicos.

2. El diagnóstico de dolor neuropático:

- Se basa principalmente en los hallazgos clínicos. La presencia de síntomas o signos por sí sola no justifica el uso del término neuropático. (Ej. dolor provocado por el tacto).
- La sintomatología es diversa y los síntomas persisten, tienden a volverse crónicos y difíciles de tratar.
- Frecuentemente los síntomas iniciales incluyen dolor y sensaciones desagradables de ardor. Comúnmente el dolor es hormigueante, lancinante, punzante o ardoroso y ocurre con parestesias que suelen empeorar por la noche. En ocasiones se acompaña de respuesta exagerada a estímulos dolorosos y dolor causado por contacto (ropa, zapatos).
- Es fundamental una historia detallada y un examen de los signos característicos del dolor neuropático considerando los diagnósticos diferenciales de neuropatía.
- De acuerdo a la literatura, en situaciones en las que las características clínicas son atípicas, el diagnóstico no es claro o se sospecha una etiología diferente, valorar pruebas electrofisiológicas o la derivación a neurología. Las características atípicas incluyen neuropatía motora mayor que sensorial, inicio rápido o presentación asimétrica.

3. Alternativas disponibles en Listado Oficial de Medicamentos para el tratamiento de dolor neuropático acordes con los lineamientos internacionales (FDA, CIMA, EMA).

Medicamento	Indicaciones Oficiales	NNT	Recomendación Terapéutica.
Amitriptilina	Tratamiento del dolor neuropático.	3,6 (3-4,4)*	Primera opción en el tratamiento en dolor neuropático**
Gabapentina	Tratamiento del dolor neuropático.	6,3 (5-8,4)*	Segunda opción en el tratamiento en dolor neuropático**
Carbamazepina	Neuralgia esencial del trigémino.	1.8*	Primera opción en el tratamiento de neuralgia del trigémino.**

* Colloca L, Ludman T, Bouhassira D, Baron R, Dickenson AH, Yarnitsky D, et al. Neuropathic pain. Nature Reviews Disease Primers. 16 de febrero de 2017;3(1):1-19

** Dolor neuropático - manejo farmacológico del dolor neuropático en entornos no especializados. Nov 2013 NICE; The Pharmacological Management of Neuropathic Pain in Adults NHS Nov 2018; Guía de Práctica Clínica sobre el Tratamiento Farmacológico del Dolor Neuropático Periférico en Atención Primaria (España 2016); Guías Clínicas Dolor neuropático España 2019 (Sociedad Española de Atención Primaria)



INSTITUTO SALVADOREÑO
DEL SEGURO SOCIAL

4. Se solicita dar cumplimiento a las regulaciones incluidas en el Listado Oficial de Medicamentos; se amplía el NIVEL DE USO: ER, es decir ampliando el uso del código 8080308 Gabapentina 300 mg Cápsula para médicos Especialistas, R: Criterio de uso establecido en el LOM.


CÓDIGO	NOMBRE GENÉRICO (DCI)	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN	N	P	C	CLAVE DESPACHO ALMACÉN
8080201	Amitriptilina Clorhidrato	25 mg	Tableta Recubierta	Empaque Primario Individual	G	1	HASTA 180	1 A
8080301	Carbamazepina	200 mg	Tableta Ranurada	Empaque Primario Individual protegido de la luz.	G	1	HASTA 240	1 A
CRITERIO DE USO	Requiere evaluación de las pruebas renales, hepáticas, hematológicas y electrolitos antes y durante la terapia con este medicamento.							
8080308	Gabapentina	300 mg	Cápsula	Empaque primario Individual	ER	2	90 - 120 (MAX. 180)	2 D
CRITERIO DE USO	<p>Indicado en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tratamiento Adjunto en Epilepsia de difícil Control • Tratamiento de segunda línea en dolor neuropático periférico en adultos, cuando hay falta de respuesta o intolerancia a la terapia con Antidepresivos Tricíclicos (ATC), o existe una contraindicación a estos. <p>NOTA: La eficacia y seguridad de Gabapentina por más de 5 meses de tratamiento no ha sido evaluada en ensayos clínicos.</p>							

Se solicita a Directores de los Centros de atención, Comités Locales de Farmacoterapia, jefaturas de Farmacia apoyar las regulaciones y lineamientos emitidos, realizar el monitoreo y vigilancia de su cumplimiento, divulgar esta información a los médicos prescriptores y áreas involucradas y promover el uso adecuado de estos medicamentos.

Atentamente,


Dra. Jenny Patricia Solano Preza
 Jefa de Sección Regulación de Medicamentos


Dr. Ernesto Chávez Coto
 Jefe Departamento de Regulación.


Dr. José Adán Martínez Alvarenga
 Jefe División Regulación, Normalización y Vigilancia.